

BUSCOPAN

SPASMOLYTIQUE ANTI – CHOLINERGIQUE

INDICATIONS

Troubles spasmodiques en gastro – entérologie, hépatologie, urologie, gynécologie, obstétrique, radiologie.

CONTRE- INDICATIONS

Glaucome et rétention urinaire des prostatiques.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

ADULTE :

- Traitement de fond :

1 ou 2 comprimés dragéifiés, deux ou trois fois par jour ou 1 à 3 suppositoires par jour.

- Cas aigus (coliques hépatiques, néphrétiques, etc.) :

1 ampoule par voie intraveineuse. L'injection pourra être renouvelée dans la journée par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

ENFANT :

1/4 à 1/3 des doses préconisées chez l'adulte.

EFFETS INDESIRABLES

Troubles habituels aux atropiniques.

TABLEAU A

FORMES ET PRESENTATIONS

Comprimés dragéifiés : Boite de 40 dosés à 10 mg de bromure de N-butyl hyoscine. A.M.M. 301.621.4.

Suppositoires : Boite de 6, dosés à 10 mg. A.M.M. 301.622.0.

Soluté injectable : Boite de 6 ampoules de 1 ml, dosées à 20 mg. A.M.M. 301.620.8.

Laboratoire DELAGRANGE