

LA COLIQUE

I- Généralité :

Terme utilisé à l'origine pour désigner une **contraction** douloureuse et **spastique** de l'**intestin** et en particulier du **colon**. Actuellement il désigne tout épisode douloureux causé par un **spasme** de la **musculature** lisse d'un **organe**, en général abdominal. Elle est caractérisée, outre une **douleur aiguë** (par accès), par des localisations particulières et une diffusion de cette douleur.

II- Typologie :

On distingue :

1- la colique intestinale :

Elle est liée à des affections diverses de l'intestin (**appendicite, colite, occlusion intestinale**) ;

2- la colique hépatite :

Elle se localise à l'**hypocondre** droit, la douleur **irradiant** vers le haut, elle est provoquée par un **calcul** qui se bloque dans les voies biliaires ou par une **contraction** de la **vésicule biliaire** à l'occasion d'**inflammations** chroniques ou aiguës.

La douleur violente, s'accompagne volontiers de **nausées** ou de **vomissement**, d'une **parésie** intestinale, d'une **fièvre** discrète.

Après avoir écarté l'urgence chirurgicale, le repos au lit, au calme, sera conseillé. La **température**, l'aspect des **urines** et des **matières** seront surveillés. On prescrira une diète hydrique **24 à 48 heures** suivie d'une reprise très progressive d'une alimentation légère. Une **vessie de glace** sera placée sur l'**abdomen**.

Contre l'état nauséux le malade boira un **cholagogue**.

Il sera prescrit avant chaque repas la prise d'un **cholérétique, spasmolytique** des voies biliaires.

Si les douleurs sont difficiles à supporter il faudra prescrire une association **antalgique, antispasmodique** tel l'**algo-buscopan** en injection intramusculaire **matin** et **soir**. Dès que possible une **radiographie** de l'abdomen sans préparation sera pratiquée, suivie une **huitaine de jours** plus-tard d'une **cholécystographie**.

3- la colique néphrétique :

Elle correspond à un spasme d'un **urètre** lors de la migration d'un calcul ou à des processus inflammatoires aigus **pyéliqués**, la douleur irradie dans la jambe correspondante ;

4- la colique utérine :

Dans ce cas, la douleur naît dans la région lombosacrée et irradie vers le **pubis**, est liée à une contraction spastique de l'**utérus** fonctionnelle ou secondaire à une maladie de l'utérus ou des **annexes**.