

DOGMATIL

NEUROLEPTIQUE DESINHIBITEUR

INDICATIONS - Etats névrotiques (post-traumatiques, dépressions réactionnelles, états d'inhibition avec asthénie ou cénestopathies) : maladie ulcéreuse gastro-duodénale ; migraines fonctionnelles ; syndromes vertigineux.

CONTRE- INDICATIONS - Phéochromocytome (sauf comme test d'épreuve) ; le glaucome et l'hypertrophie prostatique ne sont pas des contre-indications.

PRECAUTIONS D'EMPLOI -Réduire la posologie chez l'insuffisant rénal grave et prescrire des cures discontinues.

EFFETS INDESIRABLES - Ceux des neuroleptiques : syndromes extra-pyramidaux aisément réductibles par les correcteurs habituels (antiparkinsoniens de synthèse), aménorrhée, galactorrhée, incidence endocrinienne, en particulier mammaire, impliquant les précautions habituelles, comme avec la plupart des psychotropes.

Comme avec tout neuroleptique, l'administration du dogmatil chez les épileptiques et les parkinsoniens nécessite une surveillance particulière.

SURDOSAGE EVENTUEL - Aucune léthalité n'a été observée bien que les doses absorbées accidentellement ou dans un but de suicide aient atteint jusqu'à **16 g** en une prise. la thérapeutique est uniquement symptomatique.

POSOLOGIE - Selon les indications : **2 ou 3 ampoules I.M. par jour, 2 à 6 gélules par jour, 2 à 6 cuillérées à café par jour.** Pédiatrie : en moyenne **20 gouttes/kg/jour.**

PRESENTATIONS – Soluté injectable : boîte de 6 ampoules de 2 ml dosées à 100 mg de sulpiride. Gélules : boîte de 30 dosées à 50 mg. Soluté buvable : flacon de 200 ml dosé à 25 mg/c.a.c. (ou 5 mg par 20 gouttes).

Laboratoire DELAGRANGE