

# NORMOLIPOL

## Clofibrate

CLASSE THERAPEUTIQUE – HYPOCHOLESTEROLEMIANT.

**PROPRIETES** - Action normolipémiante portant sur le cholestérol sanguin et les triglycérides. Légère diminution de l'uricémie. Diminution du fibrinogène sanguin. Activité anti-agrégante plaquettaire.

**INDICATIONS** – Manifestations athéroscléreuses liées ou non à des perturbations lipidiques.

**CONTRE - INDICATIONS** – Perturbations hépatiques et rénales sévères. Grossesse.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI** - Dans le cadre de traitements mixtes avec des **antivitamines k**, réduire la dose de ces dernières (en moyenne d'**1/3**) sous couvert des contrôles biologiques habituels. Surveillance très attentive en cas d'hyperlipidémies associées à des poussées de pancréatite.

**EFFETS INDESIRABLES** – Intolérance digestive (nausées, gastralgies). Elévation de certaines enzymes (transaminases, créatine – phosphokinase). Très légère augmentation de la fréquence des calculs vésiculaires.

**POSOLOGIE** - **3 à 4 capsules par jour**, en **2 prises** à la fin des principaux repas. L'action du Normolipol étant purement suspensive, sa prescription doit être poursuivie de façon indéfinie chaque fois que le traitement diététique ne suffit pas à maintenir le lipidogramme dans des limites normales.

**COMPOSITION - PRESENTATION** - Boite de **120 capsules** souples dosées à **500 mg** de **clofibrate pur**.

Laboratoire DELAGRANGE