

PENICLINE

Ampicilline

ANTIBIOTIQUE BACTERICIDE A SPECTRE ETENDU

Infections polymicrobiennes, en particulier dans les localisations respiratoires, hépato-intestinales, urinaires.

- **VOIE ORALE :**

Adulte : 1 ou 2 gélules à 500 mg, 2 fois par jour.

Enfant : 1 ou 2 gélules ou sachets à 250 mg, 2 fois par jour.

Nourrisson : 50 à 100 mg/kg/jour en plusieurs prises.

- **VOIE PARENTERALE :** 1 ou 2 fois par jour :

Adulte : 1 ampoule à 1 g – **Enfant :** 1 ampoule à 500 mg – **Nourrisson :** 1/2 à 1 ampoule à 500 mg.

Ces doses peuvent être dépassées en cas d'infection sévère. Le contenu des gélules et des sachets peut être mélangé aux aliments.

- **EFFETS INDESIRABLES**

Manifestations allergiques (éosinophilie, réactions cutanées, œdème de Quincke). Modification de la flore intestinale, nausées et/ ou vomissements.

- **CONTRE – INDICATIONS**

Sensibilisation antérieure à une pénicilline ou aux céphalosporines. Mononucléose infectieuse, traitement par allopurinol (risque accru de phénomènes cutanés).

- **PRESENTATIONS**

Boite de 16 gélules dosées à 500 mg d'ampicilline. Boite de 16 gélules dosées à 250 mg d'ampicilline. Boite de 12 sachets dosés à 125 mg d'ampicilline. Boite de 16 sachets dosés à 250 mg d'ampicilline. Nécessaire pour injection I.V. ou I.M. comprenant un flacon de 1 g d'ampicilline + 1 ampoule de 5ml de soluté physiologique.

Laboratoire DELAGRANGE