

# PRIMPERAN

MODIFICATEUR DU COMPORTEMENT DIGESTIF  
ANTAGONISTE DES SUBSTANCES EMETISANTES

**INDICATIONS** - Nausées et vomissements, hoquet, migraines, dyskinésies digestives, test radiologique.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI** – Le Primpéran ne doit être associé aux dérivés anti-cholinergiques qui annulent son action digestive.

En raison de l'élimination urinaire du produit, la prudence commande de réduire la posologie chez l'insuffisant rénal grave et de prescrire des cures discontinues.

**EFFETS INDESIRABLES.** Chez certains malades soumis antérieurement aux neuroleptiques ou présentant une sensibilité particulière à ce type de produit, on peut observer, notamment chez l'enfant, à titre exceptionnel, des spasmes musculaires localisés ou généralisés, spontanément et complètement réversibles des l'arrêt du traitement. Cette évolution favorable est facilitée par les antiparkinsoniens.

Au cours de l'emploi dan la période néo-natale, et particulièrement chez le prématuré, quelques cas de méthémoglobinémie ont été signalés.

**SURDOSAGE EVENTUEL** – Aucune léthalité n'a été observée après absorption massive accidentelle ou dans un but de suicide. La thérapeutique est uniquement symptomatique.

**POSOLOGIE** – Adulte : **1/2** ou **1 comprimé 3 fois par jour** ; **1** ou **2 cuillérées à café 3 fois par jour** ; au cours des syndromes aigus **1 injection** I.M. ou I.V. à renouveler éventuellement. Enfant : **1/2 dose** adulte. Nourrisson : **0,5 mg/kg/j** répartis dans la journée.

**PRESENTATIONS** – Soluté injectable : boites de 3 et 12 ampoules dosées à 10mg de **métoclopramide**.

- Comprimé : **boite de 40** dosés à 10mg.
- Soluté buvable : flacon de **200 ml** dosé à **5 mg** par cuillérée à café.
- Gouttes buvables : flacon de **60 ml** dosé à **1/10 mg** par goutte.

**Laboratoire DELAGRANGE**