

# L'ETUDE DU SULTOPRIDE DANS LES ETATS D'AGITATION

## I- Généralité :

Le **barnetil** est un dérivé de la série des **anisamides** substitués, dont le prototype a été le **dogmatil**. Il se rapproche de celui-ci par son action **désinhibitrice** et **antipsychotique**. Il en diffère par la puissance de son effet **sédatif** et l'extrême rapidité de son action. Le barnetil est le médicament de l'**agitation psychiatrique**.

Les auteurs ont étudié le barnetil dans **22 cas** d'agitation à la fois **motrice (impulsivité, agressivité, opposition)** et **psychique (logorrhée, fuite des idées, activité ludique)**.

Le barnetil a été utilisé, selon les cas, soit par voie I.M. (**400 à 1 200 mg/jour**).

Les résultats ont été les suivants :

- **l'agitation motrice** a cédé dans tous les cas, en **3 jours** le plus souvent,
- **l'agitation psychique** a été remarquablement réduite, en **5 à 7 jours** en général, sauf en ce

concerne l'agitation ludique, moins constamment influencée.

- **les troubles de l'humeur** ont été améliorés ou normalisés dans **10 cas**, et ont persisté dans **12** autres.

La tolérance du barnetil est convenable, eu égard à son activité et à sa **posologie** : les effets extrapyramidaux, appellent l'adjonction de **correcteurs**. La **tension artérielle**, le **pouls**, les **bilans biologiques** sont restés normaux. La seule réserve quant à la tolérance est la survenue possible d'une inversion de l'**humeur**, classique avec ce type de **neuroleptique**.