

TIAPRIDAL

ANTIDOPAMINERGIQUEA POINT D'IMPACT MESO – LOMBIQUE.

INDICATIONS – Mouvements anormaux, choréiques en particulier ; algies neuro-musculaires, céphalées ; troubles du comportement avec agitation et anxiété au cours de l'éthylisme aigu et chronique et chez le sujet âgé.

EFFETS INDESIRABLES – Un effet neuroleptique, peut être noté chez les sujets sensibilisés (aménorrhée, galactorrhée, somnolence, dyskinésies neuro-musculaires).

POSOLOGIE- Indications courantes : traitement d'attaque : **2 à 4 comprimés** par jour pendant **3 à 8 jours**. Le cas échéant **2 à 4 ampoules I.M.** par jour pendant **3 jours** : traitement d'entretien : généralement **1 à 2 comprimés par jour**.

- **Delirium, prédelirium** : **4 à 12 ampoules par 24 h**, par voie I.M. ou I.V.
- Mouvements anormaux : **3 à 8 comprimés par jour**.
- Agitation du sujet âgé : **1 à 4 ampoules I.M.** ou I.V. réparties dans les **24 heures**.
- Posologie infantile : (**7 à 12 ans**) : **1/2 comprimé 2 ou 3 fois par jour**.
- Posologie maximale utilisée : dans certains cas de delirium, par voie injectable, une posologie de **1 800 mg/24 h** et de **1 600 mg/24 h pendant 7 jours** a été utilisée.
- Le Tiapridal peut être prescrit chez le glaucomateux et le prostatique. Il est dépourvu d'effet dépresseur, cardiaque et respiratoire. La tolérance du Tiapridal a été confirmée chez les sujets fragiles (éthyliques, sujets âgés).

PRESENTATIONS – Comprimés sécables : boîte de **20 dosés à 100 mg** de tiapridal, - Ampoules injectables de **2 ml** : boîte de **12 dosés à 100 mg**.

Laboratoire DELAGRANGE