

# LES TROIS MALADIES INFANTILES

## I- Généralité :

Les maladies infantiles sont les maladies qui attaquent les enfants en bas âge. Ce sont : la **coqueluche**, la **diphtérie** et la **poliomyélite**.

## A- La Coqueluche :

### 1- Définition :

La coqueluche est une maladie très contagieuse. Elle est caractérisée par une toux tenace et persistante sous forme de quintes.

### 2- Symptômes :

La maladie se déroule en trois phases :

- **La première phase**, elle est silencieuse et il n'y a pas de signes caractéristiques.
- **La seconde phase**, elle se caractérise par un écoulement nasal, par des yeux rouges et

larmoyants ; l'enfant tousse mais ne crache pas.

- **La troisième phase**, celle des quintes, la toux devient caractéristique, parfois accompagnée de vomissements.

La coqueluche est causée par un bacille. La contamination est directe. Les microbes sont projetés par le malade lors des accès de toux.

### **3- Traitement :**

Il existe un vaccin anticoquelucheux qui est parfois associé à d'autres vaccins. Le vaccin combiné **D.T.COQ** protège, à la fois, contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

Le malade atteint de coqueluche doit être isolé.

## **B- La Diphtérie :**

### **1- Définition :**

La diphtérie est une maladie contagieuse, parfois mortelle chez les enfants de 3 mois à 6 ans.

### **2- Symptômes :**

L'enfant atteint de diphtérie est d'abord fiévreux, sa gorge douloureuse l'empêche de manger. Puis apparaissent :

- Un dépôt grisâtre (fausses membranes) sur le palais, dans la gorge et dans le nez.
- De gros ganglions au cou.

La diphtérie est provoquée par le bacille de Loeffler. Il se transmet par contact direct avec un malade ou un porteur de germes (sain).

### **3- Traitement :**

Le traitement contre la diphtérie repose sur la vaccination des enfants avec le combiné **D.T.COQ**.

La diphtérie est traitée au centre de santé avec du sérum antidiphtérique.

## **C- La Poliomyélite :**

### **1- Définition :**

La poliomyélite est une maladie virale qui attaque les enfants de 3 mois à 5 ans, caractérisée par la paralysie des membres. Le virus se transmet par l'eau et les aliments contaminés par les selles des personnes malades.

### **2- Symptômes :**

C'est une maladie dont la gravité est variable :

- Certaines personnes contaminées ne présentent aucun signe.
- D'autres personnes présentent, pendant trois jours, de la fièvre, un manque d'appétit, un mal de gorge.
- Enfin, d'autres présentent une fièvre élevée, des douleurs dans les muscles des membres. La paralysie des membres rend l'enfant infirme durant toute sa vie.

### **3- Traitement :**

Il n'y a pratiquement pas de traitement contre la poliomyélite ; souvent on procède à une rééducation. Il faut donc vacciner les enfants avec le vaccin antipoliomyélitique.

### ENFANTS DE 0 A 2 ANS

BCG + POLIO 0 dès la naissance  
DTCP – 1 dès l'âge de 6 semaines  
DTCP – 2 un mois après DTCP – 1  
DTCP – 3 un mois après DTCP – 2  
DTCP Rappel à la demande  
ROUGEOLE à partir de 9 mois  
FIEVRE JEUNE à partir de 9 mois

### FEMMESDE 14 A 45 ANS

VAT – 1 dès le premier contact ou première visite de grossesse  
VAT – 2 30 jours après VAT – 1  
VAT – R1 6 mois après VAT – 2 ou grossesse ultérieure  
VAT – R2 1 an après VAT – R1 ou grossesse ultérieure  
VAT – R3 un an après VAR – R2 ou grossesse ultérieure.-

### QUESTIONS :

- 1- Comment se manifeste la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite ?
- 2- Comment s'effectue la transmission des microbes de ces 3 maladies ?
- 3- Comment peut-on éviter ces trois maladies ?