

L'ULCERE

I- Généralité :

Perte de **substance cutanée** ou **muqueuse**, sans tendance à la **cicatrisation** spontanée.

Les ulcères peuvent avoir des **causes traumatiques** (**caustiques**, **radiations ionisantes**), des **causes infectieuses** (**ulcère gommeux syphilitique**), des **causes circulatoires** (**ulcère de jambe**, lié aux **thrombophlébites** ou **ulcère variqueux**, lié aux **varices**), des **causes de déficience** de **nutrition locale** des **tissus** (**ulcère trophique** lié aux **troubles circulatoires et nerveux**).

II- Ulcère gastroduodéal :

Maladie d'origine incertaine, caractérisées essentiellement par une perte de substance de la muqueuse de l'**estomac** et du **duodénum** (**ulcère peptique** ou **ulcère anastomotique**).

L'**érosion** a une forme grossièrement circulaire de dimension variable, et est généralement causée par l'action **corrosive** de l'**acide chlorhydrique**, avec une diminution de **facteurs de protection** de la **muqueuse gastrique**.

Les **facteurs nerveux** et **psychiques** influencent de manière décisive la formation **anatomo-fonctionnelle** du tube digestif, dans la mesure où l'ulcère **gastroduodéal** est une manifestation **psychosomatique** typique.

L'ulcère gastroduodéal peut être **asymptomatique**, se manifestant seulement lors de complications ; mais, en général, il est caractérisé par des **douleurs épigastriques** qui se calment lors d'ingestion de **substances alcalines**.